

telas in extremitate arborum involvendo struit et ibi ova plurima reponit, et ex ovis illis parvae erucae in principio veris proveniunt quae in Augusto tecta subintrant et a parietibus in rimis pendentes, duram circa se pellem contrahunt, pelle pilosa quam prius habuerunt exuta et vivunt vita quasi dormientis et sopiti animalis: et ex illa quasi ovali natura aliam formam volatilis accipiunt, et tunc in autumno volando coeunt diutissime sibi invicem adhaerendo: et femina quidem bifurcata vulva in se recipit caudam maris, et tunc tot ova femina concepit, ac si tota convertatur in ova et ideo iuxta ova mortua quasi pellis vacua invenitur. Ova autem facit arboribus adhaerens et plantis 10 quia illarum foliis pascitur primo: postea autem quando volat, longa promiscuda quam quandoque incurvat quandoque extendit, flores sugit.

18. | Engulas vermis est ex re nomen habens quia totum caput et gulam sanguini quod semper sugit, immergit et tantum trahit quod crepat; et adhaeret labiis luporum et canum et vocatur a quibusdam 15 pediculus silvae, vulgariter autem theca vocatur. ||

19. | Formica|| vermis est parvus valde qui hoc habet proprium quod in maiori aetate crescit et virtute. Est autem providus sibi escas quidem non faciens ut apis, sed congregans et condens; grana sicca colligit et condit et si maiora sunt quam vires subpetunt, scindit. Vias 20 ordinate observant ne exuentis intrantes impediant obviando. Grana etiam humida siccant ne putrescant. Pronosticantur auras quia ante tempus tempestatis ad casas se congregant. Mortuas dicuntur ferre ad sepulturam. Sulfur et origanum agreste ita abhominantur quod si haec duo pulverizata super domos earum spargantur, casas dimittunt. || 25 Morsu suo venenosum humorem spargunt qui pustulas excitat. In senectute etiam quaedam volare incipiunt. Formica etiam sugit fructus et animalium corpora quae invenit et exinde capit nutrimentum. Generando primo ova facit quae in vermes albos paniculis involutos erumpunt, et ex hiis in superficie ad solem expositis formicæ nascuntur. || 30 Hyeme quiescit cibo quem sibi aestate providit sustentata.

20. | Formicaleon dicitur leo formicarum qui alio nomine murmycaleon vocatur. Hoc autem animal non est primo formica ut quidam dicunt. || Expertus enim sum multotiens et ostendi sociis hoc animal engulas fere habere figuram et absconditur in sabulo semispiram in sabulo fodiens cuius polus est os formicaleonis: et dum formicæ causa luci transeunt, ipsis capit et devorat et hoc saepius asperimus. || In hyeme etiam dicitur cibos formicarum diripere eo quod in aestate

* 13 Thom. (13 Plin. 11, 116 sine nomine) [Vine. 20, 130]. *Ixodes ricinus* L.

17 Thom. (20 Jacob. 1113, 14 24 Arist. Z. 8 p. 534 b 22 31 cf. Alb. VIII 131 egs.) [Vine. 20, 131—134].

32 Thom. (32 Adelin. II 2 = Isid. XII 3, 10) [Vine. 20, 135]. *Myrmecleon* spe.

35 engulas^y C engulasy B engulasi P.

nichil congregat sibi. || Filomenae etiam avidissime legunt formicas et ova earum et ex illis convalescent infirme.

21. | Si credendum est hiis quae in epistola Alexandri de mirabilibus Indiae scribuntur tunc in India sunt formicæ magnæ sicut 5 canes vel vulpes quatuor crura habentes et unguis aduncos, et custodiunt montes aureos et homines accedentes discerpunt: || sed hoc non satis est probatum per experimentum.

22. | Limax vermis est tardus qui testudo vocatur, a limo in quo 17 generatur et nutritur sic vocatus, hyeme latet, vere prodit, quatuor 10 habens cornua, duo brevia et duo longa quae extendit quando procedit, contrahit quando recolligitur in seipsum. Humor eius qui loco sanguinis est, efficaciter impedit ortum capillorum. ||

23. | Locusta dicitur quasi longa hasta, non quasi loco stans ut quidam dicunt: et est vermis gregatim egrediens et transiens de 15 terra in terram ad pabulum, ita etiam ad exterias ad modum nubis vento immissa venit regiones. Ovat autem autumno quae verno tempore faciunt brucum omnia devorantem: caput habet figuras capitum equi, || et ante os duo additamenta dura quae simul vicem labiorum suplent et dentium. Dura est ante et mollior post succinctorum, habens | quasi cornua filaria pro cauda: longa retro habet crura ad saltum et quatuor alia in uno latere, et quatuor alia in uno latere, et quatuor in alio ad gradendum: alas quatuor habet mobiles ad volatum membranales: | intestinum unum sorde plenum || qui est sucus herbarum: | et tot aliquando simul graduntur quod omnes terrae 25 fructus destruunt: et ideo pro lege habetur in multis terris certis temporibus exire in agrum et locustas extirpare. Mane frigore ¶ noctis fol. 423v stupefactæ resident immobiles. Orto autem sole alis laxatis omnes egrediuntur per turmas sine rege et sine lege civilitatem tirannicam custodiens: una enim aliam dicitur aliquando devorare.

30. | Hunc vermem dicunt Parthos accipere in cibum, || et forte non huius generis locusta.

24. | Lanificus vermis est || qui et bombex dicitur | qui seri- 18 cum facit. Hic erucae habet generationem. Nam primo vermis est et foliis mori cibatus sericum facit bonum. || Cibum autem accipiens 35 de foliis lactueae non adeo bonum facit sericum. | Hic vermis albus est et magnus, multis sicut eruca pedibus distensus: || in collo habet duo cornua mollia alba | et circa se facit sericum croceum vel album:

3 Thom. (3 Epist. Alex. 7 Solin. 30, 23 Plin. 11, 111) [Vine. 20, 135].

8 Thom. (8 Experim. = Isid. XII 5, 7) [Vine. 20, 138]. *Helix pomatia* L.?

13 Thom. (13 Isid. XII 8, 9 14 ut dieit Gregorius 16 Plin. 11, 101—107 et Adelin. IV 4) [Vine. 20, 139—143]. *Pachytillus* spe.

32 Thom. [Vine. 20, 138]. *Bombyx mori* L cf. Nr. 7.

partibus m. 3.

4 in Indie 26 nocte C.